

### 3. Übungsblatt zur Allgemeinen Relativitätstheorie II

**Abgabe: Montag 18.05.15** vor der Übung

**Aufgabe 1 (10 Punkte): *Killing-Vektoren und deren Berechnung für die äußere Schwarzschildmetrik***

Killing-Vektoren bezeichnen lokale Isometrien (Symmetrietransformationen) in der Raumzeit. Eine notwendige Bedingung für deren Existenz ist, dass ein Vektor  $\xi_\alpha$  existiert, der die Gleichung

$$g_{\alpha\beta,\sigma}\xi^\sigma + 2g_{\lambda(\alpha}\xi^\lambda_{,\beta)} = 0 \quad (1)$$

erfüllt (Killing-Gleichung).

a) Zeigen Sie, dass dies zur kovarianten Charakterisierung  $\xi_{(\alpha;\beta)} = 0$  äquivalent ist.

b) Bestimmen Sie für die Schwarzschildmetrik

$$ds^2 = \left(1 - \frac{a}{r}\right) dt^2 - \left(1 - \frac{a}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2(d\Theta^2 + \sin^2\Theta d\phi^2) \quad (2)$$

die 4 Killing-Vektoren (einer ist zeitartig, drei sind raumartig).

Hinweise: Stellen Sie zunächst das vollständige partielle Differentialgleichungssystem auf. Aus drei dieser Gleichungen zeigt man, dass  $\xi^1 = 0$  und  $\xi^0$  nur eine Funktion von  $\Theta$  und  $\phi$  ist (eine Gleichung für  $\xi^1$  kann direkt partiell integriert werden). Mittels der anderen Gleichungen erhält man dann ebenso Einschränkungen für  $\xi^2$  und  $\xi^3$ . Die Gleichungen können dann entsprechend integriert werden. Beachten Sie bitte, dass die bei einer partiellen Integration auftretende „Konstante“, eine Funktion der noch verbleibenden Variablen ist!