

Prof. Sabine Klapp

Dr. Alexander Carmele, Dr. Malte Selig, Arne Zantop

**10. Übungsblatt – Quantenmechanik II****Abgabe: Do. 16.01.2020 bis 12:00 Uhr, Briefkasten ER-Gebäude***Bei den schriftlichen Ausarbeitungen werden ausführliche Kommentare zum Vorgehen erwartet. Dafür gibt es auch Punkte! Die Abgabe soll in Dreiergruppen erfolgen.***Aufgabe 19 (20 Punkte): Hartree-Fock Faktorisierung**Zeigen Sie die Hartree-Fock Faktorisierung für fermionische Operatoren  $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_i$  im Zustand  $i$ :

$$(1) \quad \text{tr}(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_l \hat{a}_m \hat{\rho}(t)) \approx \text{tr}(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_m \hat{\rho}(t)) \text{tr}(\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_l \hat{\rho}(t)) - \text{tr}(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_l \hat{\rho}(t)) \text{tr}(\hat{a}_j^\dagger \hat{a}_m \hat{\rho}(t)).$$

Dabei macht man die Annahme, dass die Dichtematrix  $\hat{\rho}(t)$  zu jeder Zeit als generalisierter kanonischer statistischer Operator von Einteilchenobservablen dargestellt werden kann (Erklärung in Übung):

$$\hat{\rho}(t) \approx \frac{1}{Z} e^{-\sum_{ij} \lambda_{ij} \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j} \quad Z = \text{tr}(e^{-\sum_{ij} \lambda_{ij} \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j}),$$

wobei die Matrix  $\lambda_{ij}$  hermitisch ist ( $\sum_{ij} \lambda_{ij} \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j$  sind Observablen) und  $Z$  die Zustandssumme bezeichnet.

Dazu:

(1) Führen Sie die unitäre Matrix  $\phi$  ein, die die Matrix  $\lambda$  diagonalisiert:  $\lambda^{dia} = \phi \lambda \phi^{-1}$  und transformieren Sie die Operatoren

$$\hat{b}_i = \sum_k \phi_{ik} \hat{a}_k \quad \hat{b}_i^\dagger = \sum_k \phi_{ki}^* \hat{a}_k^\dagger$$

in der Definition der Dichtematrix. Berechnen Sie weiterhin  $Z$  explizit unter Verwendung der Definition der Spur

$$\text{tr}(\dots) = \sum_{\{n_i\}} \langle n_1, n_2, \dots | \dots | n_1, n_2, \dots \rangle$$

für einen vollständigen Satz von Besetzungszahlen.

(2) Berechnen Sie

$$\text{tr}(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_l \hat{a}_m \hat{\rho}(t)) = \sum_{hkpq} \phi_{hi} \phi_{kj} \phi_{lp}^* \phi_{mq}^* \sum_{\{n_i\}} \frac{1}{Z} n_h n_k (\delta_{hq} \delta_{kp} - \delta_{hp} \delta_{kq}) \Pi_w e^{-\lambda_w^{dia} n_w}.$$

(3) Berechnen Sie analog zu (2) :

$$\text{tr}(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j \hat{\rho}(t)) = \sum_k \frac{\phi_{ki} \phi_{jk}^* e^{-\lambda_k^{dia}}}{1 + e^{-\lambda_k^{dia}}}.$$

(4) Kombinieren Sie die Ergebnisse aus (2) und (3), um das Endergebnis Gl. (1) zu beweisen.

## 10. Übung QM2 WS19/20

**Vorlesung:** Di. um 8:15 Uhr – 9:45 Uhr in EW 203,  
Do. um 8:15 Uhr – 9:45 Uhr in EW 203.

### Sprechzeiten:

Prof. Sabine Klapp	Di.	13:15 - 14:00	in EW 707
Dr. Alexander Carmele	Di.	13:00 - 14:00	in EW 704
Dr. Malte Selig	Mo.	13:00 - 14:00	in ER 238
Arne Zantop	Fr.	14:00 - 15:00	in EW 701

### Scheinkriterien:

- Mindestens 50% der schriftlichen Übungspunkte.
- Regelmäßige und **aktive** Teilnahme in den Übungen.

### Literatur zur Lehrveranstaltung:

- W. Nolting, Grundkurs Theoretische Physik 5/1,2: Quantenmechanik (Springer)
- U. Scherz, Quantenmechanik (Teubner)
- F. Schwabl, Quantenmechanik für Fortgeschrittene (Springer)
- E. Fick, Einführung in die Grundlagen der Quantentheorie (Aula-Verlag)
- W. Nolting, Grundkurs Theoretische Physik 7: Vielteilchentheorie (Springer)