

Prof. Sabine Klapp

Dr. Alexander Carmele, Dr. Malte Selig, Arne Zantop

7. Übungsblatt – Quantenmechanik II**Abgabe: Do. 12.12.2019 bis 12:00 Uhr, Briefkasten ER-Gebäude***Bei den schriftlichen Ausarbeitungen werden ausführliche Kommentare zum Vorgehen erwartet. Dafür gibt es auch Punkte! Die Abgabe soll in Dreiergruppen erfolgen.***Aufgabe 13 (6 Punkte): Unterscheidbare und ununterscheidbare Teilchen**Betrachten Sie die Wellenfunktion eines Zwei-Teilchenzustands $|\Psi_{ab}\rangle$ ohne Berücksichtigung des Spin-Freiheitsgrades.

- (a) Berechnen Sie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für unterscheidbare und ununterscheidbare Teilchen in diesem Zustand. Diskutieren Sie das Ergebnis für $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}$.
- (b) Wählen Sie für die Wellenfunktionen der Einteilchenzustände in a) ebene Wellen $\langle \mathbf{r}_1 | \Psi_a \rangle = \exp[-i\mathbf{k}_a \cdot \mathbf{r}_1] / \sqrt{V}$. Wie sieht damit die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte $\langle \Psi_{ab} | \Psi_{ab} \rangle$ für klassische Teilchen, Bosonen und Fermionen aus?

Aufgabe 14 (14 Punkte): Variationsverfahren für Helium-GrundzustandWir betrachten ein Helium-Atom, d.h. ein System aus zwei Elektronen mit den Ortskoordinaten \mathbf{r}_1 und \mathbf{r}_2 und einem Kern der Ladung $Z = 2$ am Ort $\mathbf{R} = 0$. Der Hamilton-Operator der zwei Elektronen sei gegeben durch

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\Delta_1 + \Delta_2) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{Z}{|\mathbf{r}_1|} - \frac{Z}{|\mathbf{r}_2|} + \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right).$$

Um die Grundzustands-Wellenfunktion des Helium-Atoms näherungsweise zu bestimmen, benutzen wir den folgenden Ansatz: $\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \Psi_{100} \rangle = \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, Z_{\text{eff}}) = \psi_{100}(\mathbf{r}_1, Z_{\text{eff}})\psi_{100}(\mathbf{r}_2, Z_{\text{eff}})$, wobei

$$\psi_{100}(\mathbf{r}, Z_{\text{eff}}) := 2 \left(\frac{Z_{\text{eff}}}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\frac{Z_{\text{eff}}}{a_0} |\mathbf{r}|} \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

die Grundzustands-Wellenfunktion eines Elektrons im Feld eines Kernes mit Ladung Z_{eff} ist.

- (a) Zeigen Sie, dass die Variation des Parameters Z_{eff} nach dem Ritzschen Variationsverfahren zu einem Extremum bei $Z_{\text{eff}} = Z - 5/16$ führt und daraus der Näherungswert

$$E_g = \min(\langle \Psi_{100} | H | \Psi_{100} \rangle) = \left(-2Z^2 + \frac{5}{4}Z - 2 \left(\frac{5}{16} \right)^2 \right) \text{Ry}$$

für die Grundzustandsenergie des Helium-Atoms folgt ($1 \text{ Ry} = \hbar^2/(m_e a_0^2) \approx 13.6 \text{ eV}$). Zeigen Sie, dass die entsprechende Wellenfunktion normiert ist, und rechnen Sie dann den Energiemittelwert im Ortsraum aus. Leiten Sie diesen nach Z_{eff} ab und suchen das Minimum. Setzen Sie den gefundenen Wert in den Energiemittelwert ein.

- (b) Berechnen Sie die Grundzustands-Energiekorrektur des Helium-Atoms durch die Elektron-Elektron-Wechselwirkung in 1. Ordnung Störungstheorie. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Ergebnis aus (a) und dem experimentellen Wert $E_g = -78.975 \text{ eV}$.
- (c) Wie lässt sich anschaulich erklären, dass der Wert von Z_{eff} gegenüber der Kernladung $Z = 2$ des Helium-Atoms reduziert ist?

7. Übung QM2 WS19/20

Vorlesung: Di. um 8:15 Uhr – 9:45 Uhr in EW 203,
Do. um 8:15 Uhr – 9:45 Uhr in EW 203.

Sprechzeiten:

Prof. Sabine Klapp	Di.	13:15 - 14:00	in EW 707
Dr. Alexander Carmele	Di.	13:00 - 14:00	in EW 704
Dr. Malte Selig	Mo.	13:00 - 14:00	in ER 238
Arne Zantop	Fr.	14:00 - 15:00	in EW 701

Scheinkriterien:

- Mindestens 50% der schriftlichen Übungspunkte.
- Regelmäßige und **aktive** Teilnahme in den Übungen.

Literatur zur Lehrveranstaltung:

- W. Nolting, Grundkurs Theoretische Physik 5/1,2: Quantenmechanik (Springer)
- U. Scherz, Quantenmechanik (Teubner)
- F. Schwabl, Quantenmechanik für Fortgeschrittene (Springer)
- E. Fick, Einführung in die Grundlagen der Quantentheorie (Aula-Verlag)
- W. Nolting, Grundkurs Theoretische Physik 7: Vielteilchentheorie (Springer)